

**SYSTEME DE FINANCEMENT ET D'ASSURANCES AGRICOLES EN HAÏTI
(SYFAAH)**

Réussir son élevage de poulets de chair

IICA



Table des Matières

1)- INTRODUCTION	4
KISA KI GEN NAN TI LIV SA A	5
2)- OBJECTIF DE L'ELEVAGE.....	6
REZIME : KISA YON POUL DE CHÈ YE	6
3)-COMMENT CONSTRUIRE LE POULAILLER ?	7
KOUMAN POU BATI YON BON POULAYE	7
4)- POURQUOI ET COMMENT CHAUFFER LES POUSSINS ?.....	8
REZIME KOUMAN POU CHOFÉ TI POUL YO	8
5)- COMMENT ETABLIR LA POUSSINIERE.....	10
KOUMAN POUW PRÉPARE POUSINYE A	10
6)-COMMENT NOURRIR LES POULES SELON LES MANUELS DE COBB 500 ou ROSS 308	10
REZIME: KOUMAN POU W BAY POUL YO MANJE JAN LIV COBB 500 AK ROSS 308 LA DI L.....	11
7)-PERFORMANCES ET OBJECTIFS DES POUSSINS COBB 500 ou ROSS 308	11
REZIME : KI JAN POUL LA DWE GRANDI POUL KA FÈ KOB.....	12
8)- COMMENT CHOISIR ET INSTALLER LES EQUIPEMENTS	12
REZIME KOUMAN POU CHWAZI AK ENSTALE EKIPMAN.....	13
9)-LA GESTION QUOTIDIENNE DU POULAILLER	13
REZIME : KISA POU KONTWOLE CHAK JOU NAN POULAYE LA	14
10)- PROGRAMME DE VACCINATION	14
REZIME: KI JAN POU W VAKSINEN POUL YO.....	15
11)- QUELQUES MESURES DE BIO SECURITE	16
REZIME: KÈK MEZI BIO SEKIRITE	17
ANNEXE-1.....	18
ANNEXE -2.....	20
ANNEXE -3.....	21

1)- INTRODUCTION

Le document « GUIDE PRATIQUE DE PRODUCTION DE POULETS DE CHAIR » a été élaboré en octobre 2013, dans le but de servir de matériel didactique à 10 Conseillers en Techniques de Gestion (CTG) ainsi qu'à 25 agro entrepreneurs membres de l'Association Haïtienne pour la Promotion de l'Élevage (AHPEL), dans le cadre d'une formation sur le terrain du genre « champ-école », organisée pour une durée de 2 mois par IICA, dans le cadre du projet SYFAAH.

Ce manuel, inspiré par les interrogations des participants, a été révisé à partir des commentaires du MARNDR, à des fins de publication et au bénéfice d'un plus large public. Nous y avons ajouté des illustrations dans le but de rendre le texte plus explicite, et également de suggérer aux lecteurs des modèles à partir desquels ils pourraient s'inspirer.

De nos jours, avec les progrès de la génétique, la vitesse de croissance d'un poulet de chair est plus rapide, le temps d'élevage plus court, les animaux plus exigeants en matière d'alimentation, et l'efficacité alimentaire améliorée. Cet ouvrage, qui contient des informations mises à jour en fonction du niveau de performance des animaux, est conçu dans le but de servir d'aide-mémoire.

Qu'est-ce qu'un poulet de chair, comment construire le bâtiment, comment chauffer les poussins les premiers jours, comment établir la poussinière, comment nourrir les poussins, quels sont les objectifs et les performances à atteindre, quels vaccins administrer, telles sont les interrogations les plus courantes auxquelles nous nous proposons de répondre, tout en éclaircissant bien d'autres questionnements.

KISA KI GEN NAN TI LIV SA A

Liv sa a chita sou sa ki nan dokiman «GUIDE PRATIQUE DE PRODUCTION DE POULETS DE CHAIR» ki te ekri nan mwa Oktòb 2013, nan kad yon fomasyon Biwo IICA te òganize nan pwojè SYFAAH selon metod chan ekol pandan 2 mwa pou 25 manm Asosyasyon pou elvaj (AHPEL) ak agwonòm CTG ki ap travay nan pwojè a nan IICA.

Nan ti liv sa a, nou pral reponn kèk kesyon ki pi enpòtan yon moun ki nan pwodiksyon poul ka poze tèt li: Kisa yon poul de chè ye, kijan pouw bati poulaye la, kijan pouw chofe ti poul yo, kijan pouw prepare poulaye la pou ti poul yo, kisa pouw bay poul yo manje, ki rezilta pou yo baw, ki vaksen pouw bay poul yo.

- Nan chapit ki sa yon poul de chè ye, nou pral pale sou ras yo leve bò isit, ak poukisa yo te chwazi sila yo;
- Nan chapit kijan pouw bati poulaye la, nou pral pale sou prensip pou respèkte nan konstriksyon an, epi nou pral prezantew yon modèl ;
- Nan chapit kijan yo chofe ti poul yo, nou pral prezantew kèk modèl chofay ak gaz pwopàn, ak kouran elektrik, ak chabon;
- Lè fini, nou pral eksplike kijan pouw oganize yon pousinyè;
- Nou pral pale sou manje: ki kalite manje pou bay poul yo, pandan konbyen jou. Nou pral montre tou modèl ekipman yo itilize nan poulaye ki bay bon rezilta ;
- Nou pral prezante nan yon tablo pèfòmans kwasans poul yo, ak objektif yo dwe reyalize, pou w ka wè kijan w ka fè kòb ak poul la ;
- Nou pral prezante w pwogram vaksinasyon ki pral garanti siksè elvaj ou a, ak yon ti explikasyon sou maladi sila yo;
- Lè fini, nou pral fè yon ti rapèl sou mezi biosekirite pouw mete an plas pou asire siksè elvaj ou a.

2)- OBJECTIF DE L'ELEVAGE

L'objectif principal de l'élevage de poulet de chair est d'obtenir un animal pesant 4 livres dans le temps le plus court que possible, soit 35 à 38 jours. C'est l'un des rares produits agricoles que l'on peut produire et commercialiser après un mois et demi.

Les principales races de poulet de chair importées couramment de nos jours en HAÏTI sont Cobb 500 et Ross 308.



COBB 500



ROSS 308

REZIME : KISA YON POUL DE CHÈ YE

Se yon poul yo leve pou pwodwi vyann. Li gwosi sitèlman rapid li ka peze 4 liv (1 liv= 454 gram) nan mwens pase 38 jou, konpare ak yon poul peyi ki pran plis pase 1 an edmi pou peze 2.75 liv.

Ras poul de chè yo enpote nan Peyi Dayiti jounen Jodi a se poul yo rele Cobb 500 ak Ross 308.

3)-COMMENT CONSTRUIRE LE POULAILLER ?



- Choisir un endroit où le sol est bien drainé avec une bonne ventilation;
- Choisir un endroit où l'eau potable est disponible, ou accessible dans le sous-sol;
- Orienter le bâtiment sur un axe EST/OUEST pour réduire le rayonnement du soleil sur les murs latéraux;
- Si possible isoler la toiture pour réduire la conductivité de la chaleur solaire;
- La largeur du bâtiment ne devra en aucun cas dépasser 30 pieds¹;
- La hauteur latérale minimale ne devra pas être inférieure à 7 pieds;
- Le point central du plafond ne sera pas inférieur à 10 pieds;
- Le débordement de la toiture n'excédera pas 4 pieds;
- La hauteur optimale de la fondation ne devra pas dépasser 1 1/2 pied pour éviter tout risque d'inondation. ;
- Le bâtiment sera de type tropical, complètement ouvert sur les côtés, seulement fermé par un treillis métallique couramment appelé « chicken wire »;
- La densité sera de un pied carré par poulet;
- Le poulailler sera construit à une distance d'au moins 100 pieds des résidences.

KOUMAN POU BATI YON BON POULAYE

- Chache yon kote tè a pa gen dlo chita, epi ki gen bonjan van;
- Mete pi piti fas poulaye la bo solèy la leve, pou li pa antre twòp sou kote poulaye a ;
- Siw kapab, mete yon nat anba do tòl la, pou diminye chalè tòl la;
- Lajè poulaye a pa dwe janm depase 30 pye;
- Arebò poulaye a pa dwe pi wo pase 7 pye;
- Fetay kay la pa dwe pi piti pase 10 pye;
- Tòl la dwe debòde sou kote poulaye, li pa dwe plis pase 4 pye ;
- Wotè fondasyon an pa dwe depase yon pye edmi;

¹ 1 pye= 30.47 cm

- Poulaye a ap ouvè sou kote pou van ka pase, lap fèmen ak yon til;
- Poulaye a dwe kalkile pou chak poul genyen yon pye kare espas pou li menm sèl, sa vle di 10 poul pou 10 pye kare;
- Pa bati poulaye la two pre kay moun, kite pou pi piti 100 pye.

4)- POURQUOI ET COMMENT CHAUFFER LES POUSSINS ?

Les 7 premiers jours après réception des poussins, il faut les chauffer, car ils sont sensibles aux variations de température.

Les poussins devront être maintenus à une température constante d'environ 42 degrés Celsius pendant au moins une semaine en attendant que leurs plumes se développent. Voilà pourquoi la première semaine, on les place dans une poussinière. On peut utiliser un chauffage à gaz propane, avec courant électrique (lampe ultraviolet) ou avec du charbon de bois. De ces 3 types, le chauffage à gaz propane est le plus économique.

REZIME KOUMAN POU CHOFE TI POUL YO

Pandan pou pi piti 1 semenn apre ou fin resevwa pousen yo, fòk ou chofe yo toutan ak yon tanperati pre 42 degre Celcius, paske yo sansib ak nenpot chanjman nan tanperati a. Se pou sa ou dwe mete yo nan yon pousinyè. Pousinyè a kapab mache ak gaz pwopàn, chabon oswa kouran.

- Ou ka chofe yo ak gaz pwopàn. Gaz pwopàn koute pi bon mache pase chabon epi li garanti yon pi bon chalè.



- Oubyen ak kouran ak yon lanp ultravyolèt. Kouran koute pi chè epi se pa toutan ou jwenn li



- Oswa ak chabon. Chabon koute pi chè pase gaz pwopàn epi li pa bon pou anviwonmàn peyi a, lè yo koupe pye bwa san replante lòt.



Nan 3 fason nou montre la pou chofe ti poul yo, se gaz pwopàn la ki pi ekonomik, jounen jodi a.

5)- COMMENT ETABLIR LA POUSSINIÈRE



- A l'extrémité EST du poulailler établir la poussinière sur un tiers du bâtiment;
- Fermer la partie sélectionnée avec des rideaux pour contenir la chaleur à l'intérieur;
- Placer la source de chaleur au milieu de la poussinière;
- Placer les équipements (mangeoires et abreuvoirs) autour de la source de chaleur;
- Mettre un abreuvoir pour 100 poussins et une mangeoire pour 40 poussins.

KOUMAN POWW PREPARE POUSINYÈ A

- Pousinyè a ap toujou fèt bo kote solèy la leve, nan yon tyè poulaye la (separe poulaye an 3 pati menm gwosè, pran yon);
- Fèmen pati sa ak rido pou kenbe chalè a;
- Mete sous chalè a nan mitan pousinyè a ;
- Mete manjwa ak abrevwa alantou sous chalè a;
- Mete yon abrewa pou 100 ti poul ak yon manjwa pou 40 ti poul.

6)-COMMENT NOURRIR LES POULES SELON LES MANUELS DE COBB 500 ou ROSS 308

	Démarrage (starter)	Croissance (grower)	Engraissement (finisher)
Quantité aliment/poule	.55 livre	2.12 livres	5.26 livres
Durée	De 1 à 10 jours	De 11 à 22 jours	De 23 à 35 jours
% de protéine	21 à 22 %	19 à 20 %	18 à 19 %
Energie métabolisable Kcal/lb	1,365	1,400	1,438

Certains fabricants d'aliments utilisent une seule ration du premier jour jusqu'à la vente. D'autres usines fournissent aux éleveurs 3 types de ration alimentaire:

- 1)-Le démarrage ou début ou "starter", à utiliser les dix premiers jours;
- 2)-la croissance ou "grower", du onzième au vingt-deuxième jour;
- 3)-L'engraissement ou "finisher", du vingt-troisième jour jusqu'à la vente.

REZIME: KOUMAN POU W BAY POUL YO MANJE JAN LIV COBB 500 AK ROSS 308 LA DI L

Gen izin ki bay yon sèl kalite manje sòti premye jou jis poul la vann.

Gen lòt ki pito bay 3 kalite manje:

- Manje yo rele estatè, pandan 10 premye jou ti poul yo;
- Manje kwasans, lè ti poul yo gen 11 jou pou rive sou 22 jou ;
- Angresman, lè ti poul yo gen 23 jou jis lè w van poul la.

7)-PERFORMANCES ET OBJECTIFS DES POUSSINS COBB 500 ou ROSS 308

Il est très important de peser les poules chaque semaine pour comparer leur poids aux objectifs à atteindre. Il en est de même du contrôle de la nourriture. L'éleveur doit veiller à ce que le poids de ses poules, ainsi que la quantité d'aliment administrée soient conformes aux objectifs visés, comme le montre le tableau de performance :

TABLEAU DE PERFORMANCE			
Age	Poids moyen	Conversion	Consommation
au 7e jour	.40 lb	.90	.36 lb
14e jour	1.02 lb	1.16	1.19 lb
21e jour	2.07 lb	1.26	2.62 lb
28e jour	3.35lb	1.40	4.70 lb
35e jour	4.82lb	1.53	7.38 lb
42e jour	6.29 lb	1.67	10.54 lb

REZIME : KI JAN POUL LA DWE GRANDI POUL KA FÈ KOB

Ti tablo sila ba w rezilta pou w jwenn lè wap leve poul yo. Chak semèn kisa poul la ta dwe peze ak ki kantite manje li ta dwe manje.

TABLO PÈFOMANS			
Laj poul la	Konbyen li peze anviwon	Konvèsyon	Kantite li manje
sou 7 jou	.40 liv	.90	.36 liv
14 jou	1.02 liv	1.16	1.19 liv
21 jou	2.07 lb	1.26	2.62 liv
28 jou	3.35lb	1.40	4.70 liv
35 jou	4.82lb	1.53	7.38 liv
42 jou	6.29 lb	1.67	10.54 liv

Se poutèt sa li enpòtan pou w peze poul yo chak semèn pou w ka konpare si rezilta poul la egal ak sa ki nan tablo a.

8)- COMMENT CHOISIR ET INSTALLER LES EQUIPEMENTS

Les performances et objectifs de production seront plus facilement atteints si vous utilisez adéquatement les équipements suivants: abreuvoir et mangeoire.

Un abreuvoir rond en forme de cloche type PLASSON pour 100 poules. Ces abreuvoirs devront être suspendus de façon à ce que le rebord de l'abreuvoir soit au niveau du dos de l'animal lorsque celui-ci est debout. L'eau devra être à 0,5 cm du rebord de l'abreuvoir le premier jour et être augmentée graduellement jusqu'à 1,5 cm.



Ou une pipette pour 10 poules



-Une mangeoire type Trémie de 25 livres pour 30 poules.



REZIME KOUMAN POU CHWAZI AK ENSTALE EKIPMAN

Ou pral jwenn yon pi bon rezilta ak poul yo siw sèvi ak ekipman sa a yo pou poul yo bwè dlo ak manje :

- Yon abrevwa pou chak 100 ti poul. Ou ka sèvi ak modèl won, tankou yon klòch, yo rele Plasson oswa ou ka sèvi ak tiyo ki gen twou yo rele Pipèt (yon pipèt pou 10 poul)
- Yon manjwa 25 liv pou 30 poul, tankou modèl Tremie an

9)-LA GESTION QUOTIDIENNE DU POULAILLER

La journée commence par l'inspection générale du poulailler :

- Les mangeoires doivent toujours être pleines d'aliment (ad libitum) ;
- Les agiter régulièrement pour faire descendre l'aliment et inciter les poules à consommer plus ;
- Régler la hauteur des équipements à hauteur du dos des poulets; l'animal doit lever la tête pour accéder à la mangeoire. En mangeant, sa tête doit être toujours plus haute que sa queue ;
- Noter chaque jour sur un registre la quantité d'aliment consommée (voir rapport journalier en annexe) ;
- Enregistrer chaque jour la mortalité ;
- Peser les animaux régulièrement chaque semaine et vérifier si le poids est conforme aux tableaux de performance ;
- Vérifier chaque semaine si la consommation réelle d'aliment est conforme à la quantité indiquée dans le tableau ;
- Retourner la litière chaque jour avec une pelle pour s'assurer qu'elle est bien sèche ;

- Nettoyer chaque jour les abreuvoirs pour éviter la contamination de l'eau ;
- Ajouter chaque jour du chlore dans l'eau pour la désinfecter ;
- La vente peut commencer à partir du 35ème jour (voir rapport journalier en annexe).

REZIME : KISA POU KONTWOLE CHAK JOU NAN POULAYE LA

Enspekte chak jou poulaye la :

- Manjwa yo dwe toujou plen manje pou poul yo ka manje lè yo bezwen;
- Souke manjwa yo tanzantan pou manje a ka desann epi ankouraje poul yo manje plis;
- Mete ekipman yo nan nivo do bèt yo. Poul la dwe leve tèt li pou l manje, manje a gaspiye mwens ;
- Note chak jou sou yon kaye kantite manje poul yo manje;
- Note tou ki kantite poul ki mouri chak jou ;
- Peze bèt yo chak semèn epi tcheke si pwa a an akò ak ti tablo pèfomans la ;
- Sèvi ak modèl rapò nou bay nan dènye paj la pou verifye si kantite manje ou achte a, avèk pwa poul la se sa ou tap chache a (objektif);
- Vire chak jou pay ki andedan poulaye a ak yon pèl pou sèten li seche ;
- Lave abrevwa yo chak jou, pou dlo a pa sal;
- Dezenfekte dlo rezèvwa chak jou ak yon ti kloroks.
- Ou ka komanse vann poul yo depi yo gen 35 jou.

10)- PROGRAMME DE VACCINATION

Les poussins seront vaccinés contre les maladies suivantes :

- GUMBORO le 7e jour.
- NEW CASTLE le 14e jour.

- NEWCASTLE. C'est une maladie virale qui provoque une pneumo encéphalomyélite. La maladie débute par des symptômes respiratoires, toux, éternuements, avant de passer à la phase nerveuse, paralysie du cou qui prend une forme de S avec le bec pointé vers la queue. L'animal alors marche à reculons et la mort intervient immédiatement après, avec un taux de mortalité de 100% en moins de 5 jours. **Il est donc important de vacciner les oiseaux le 14e jour, pour les protéger contre le virus du NEW CASTLE.**
- La maladie de GUMBORO

C'est l'infection de la bourse de FABRICIUS, appelée scientifiquement Bursite infectieuse. Ce virus affecte le système immunitaire du poulet. L'incidence de la mortalité causée par ce virus est de 50% dans le poulailler infecté. Il est important de protéger les animaux en les vaccinant le 7^e jour.

RECOMMANDATIONS

Deux jours avant et après les vaccinations, ne pas mettre de chlore dans l'eau. La présence de chlore dans l'eau de boisson peut altérer le vaccin et rendre ainsi la vaccination inefficace. Les bactéries (E. coli) n'auront pas le temps de se multiplier.

Toujours transporter les vaccins dans un thermos rempli de glaçons et à l'abri des rayons du soleil. Les rayons ultraviolets peuvent altérer le vaccin.

Les vaccins peuvent être administrés de 3 façons:

- Une goutte dans l'œil ou le nez ;
- Par aspersion;
- Ou enfin directement dans l'eau de boisson.

Pour vacciner dans l'eau de boisson, n'utilisez que des récipients en plastique ; les récipients métalliques peuvent altérer le vaccin. L'eau utilisée pour la vaccination devra être une eau potable dans laquelle vous ajouterez une tasse de lait en poudre écrémé.

Une heure avant la vaccination, nettoyez les abreuvoirs et mettez les hors de portée des animaux de façon à s'assurer qu'ils aient bien soif au moment de la vaccination. La totalité du vaccin doit être consommée en moins d'une demi-heure. Ces vaccins sont disponibles chez vos fournisseurs de poussins ou toute autre pharmacie vétérinaire de la place.

REZIME: KIJAN POU W VAKSINEN POUL YO

Ou dwe vaksinen poul yo kont 2 maladi sa yo:

- GUMBORO sou 7yèm jou
- NEW CASTLE sou 14yèm jou

- NEWCASTLE oswa maladi "kou vire"

Se yon maladi viral ki trè grav. Li komanse pa yon ti touse. Apre kèk jou poul yo vin paralize, tèt yo vire et pi yo mache pa bak. Tout poul yo nèt pral mouri nan mwens ke 5 jou. Se poutèt sa li enpòtan pou w vaksinen poul yo sou 14 jou pou pwoteje yo kont viris NEW CASTLE la.

- GUMBORO

Viris sa a afekte sistèm rezistans poul la. Viris sa ka touye mwaye poul nan poulaye a. Li enpòtan pou pwoteje bèt yo ak vaksen pou GUMBORO. Vaksinen ti poul yo sou 7yèm jou a.

Rekòmandasyon

-2 jou anvan ak 2 jou apre vaksen yo, pa mete chloroks nan dlo a ; sa kapab kontrarye vaksen a.

- Toujours pote vaksen a nan yon tèmos plen ak glas. Pwoteje vaksen yo tou kont solèy la.

-Gen 3 jan pou w bay vaksen :

- Yon gout nan je, oswa nan nen ti poul yo (si w pa gen anpil poul);
- Oswa ou flite vaksen an nan poulaye a apre ou fin fèmen tout poulaye a ak yon rido ;
- Oswa mete vaksen an nan dlo yo bwè a, nan abrevwa yo.

Sonje lè wap vaksinen nan dlo, toujou sèvi ak dlo potab, epi ak veso plastik, lot veso an metal yo ka gate vaksen an. Mete yon tas poud lèt nan yon galon dlo, apre sa mete vaksen an ladanl. Yon tatan anvan vaksinasyon an (pou pi piti inèdtan), netwaye tout abrewa yo epi kite yo chèch. Tan sa a, poul yo ap gentan swaf anpil, yap bwè dlo vaksen a pi rapid. Tout vaksen an ta dwe bwè nan mwens pase yon demi èdtan.

11)- QUELQUES MESURES DE BIO SECURITE

Il s'agit surtout de protéger les animaux contre les risques de contamination venant de l'extérieur du bâtiment. Il est donc recommandé de mettre en place les mesures de prévention suivantes :

- Limiter l'accès au poulailler. Pas de visiteurs ;
- Installer des pédiluves à l'entrée de la cage (ajouter un désinfectant à l'eau);



- Interdire l'accès aux animaux domestiques : dindes, pigeons, poules indigènes, etc.
- La présence d'un chat sur la ferme est la meilleure prévention contre les rongeurs, sinon utiliser du poison à rat. Les rats sont source de microbes en plus de pouvoir manger les poules;
- Déterminer un périmètre de sécurité clôturé autour du poulailler ;
- Toujours bien nettoyer le poulailler (avec de la chaux ou du chlore) après la vente et avant de mettre d'autres poules.

REZIME: KÈK MEZI BIO SEKIRITE

Li enpòtan pou pwoteje bèt yo kont jèm mikwòb ki ka soti lòt kote pou rantre nan poulaye a. Se konsa li ta bon pou pran prekosyon sa yo:

- Evite pou moun pa vizite poulaye a;
- Fèmen lantouray poulaye a pou plis sekirite;
- Mete yon pediliv nan antre poulaye pou touye mikwòb ki nan soulye yo (mete yon desenfektan nan dlo a);
- Pa kite lòt bèt ki lage nan lari a soti deyò rantre nan poulaye a tankou kòk gagè, kodenn, pijon, kochon, chen, chat elatriye).
- Mete yon chat nan lakou a pou goumen kont rat, sinon sèvi ak pwazon pou rat, paske anplis rat ka pote mikwòb bay poul yo li ka manje yo tou;
- Byen netwaye poulaye a lèw finn vann poul yo, anvan ou mete yon lòt rekòlt ti poul. Ou ka ntwaye l ak lacho oswa ak kloroks pou touye tout mikwob ki ka ladanl.

ANNEXE-1

Modèle de rapport journalier pour 100 poules

Date de réception:.....

Race:.....

Nom du fournisseur:.....

Date de vaccination:.....

Quantité reçue:.....

Fournisseur d'aliment:

Date	Mortalité	% de mortalité	Quantité d'aliments consommés pour 100 poules		Poids moyen par poule		Vaccination	Observations
			Réel	Objectif cumulé	Réel	Objectif		
1				Démarrage			VITAMINES ELECTROLYTES	CHAUFFAGE
2							VITAMINES ELECTROLYTES	CHAUFFAGE
3							VITAMINES ELECTROLYTES	CHAUFFAGE
4								CHAUFFAGE
5								CHAUFFAGE
6								
7				36 lbs		.40 lbs	GUMBORO	
8								
9								
10								Total aliment démarrage consommé 55 livres
11				Croissance				
12								
13								
14				119 lbs		1.02 lbs	NEW CASTLE	

15								
16								
17								
18								
19								
20								
21				262 lbs		2.07 lbs		
22								Total aliment croissance consommé 212 livres
23				Engraissement				
24								
25								
26								
27								
28				470 lbs		3.35 lbs		
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35				738 lbs		4.82 lbs		Total aliment engraissement consommé 525 livres
36								Début de la vente
37								
38								
39								
40								

ANNEXE -2

LISTE DE PRIX DES POUSSINS (5/7/18)

	USINE	DISTRIBUTEUR	IMPORTATEUR
PRIX	56 gds	60 gds	60 gds

LISTE DE PRIX DE L'ALIMENT (5/7/18)

TYPE D'ALIMENT	DEBUT	CROISSANCE	ENGRAISSEMENT	
3 rations	1.650 gds	1,600 gds	1,550 gds	Sac de 100 lbs
Ration unique	1,980 gds	-	-	Sac de 110 lbs

ANNEXE -3

Modèle de compte d'exploitation pour un élevage de 5,000 poules réalisant 5 rotations par an².

Coût direct de production

Achat/Produits	Quantité	Prix unitaire	Total
Poussin	5,000	60 gds	300,000 gds
Aliment	370 sacs/100lbs	1,600 gds/sac	608,850 gds
Main d'œuvre	2 mois	7,000 gds	14,000 gds
Carburant	2 mois	5,000 gds	10,000 gds
Transport aliment	370 sacs	40 gds/sac	14,800 gdes
Total Achat	----	----	947,650 gds

Valeur de Stock

5,000 poules – 5% de mortalité (250 poules) = 4,750 poules

Poids des poules

4,750 poules x 4.83 lbs/poule = 22,942.50 lbs

Prix de vente

22,942.50lbs x 60gdes/lb = **1, 376,550.00 gdes**

RESULTAT ANNUEL

	Prix de Vente	Coût de Production	Marge Brute
Rotation 1	1,376,550.00	947,650.00	428,900.00
Rotation 2	1,376,550.00	947,650.00	428,900.00
Rotation 3	1,376,550.00	947,650.00	428,900.00
Rotation 4	1,376,550.00	947,650.00	428,900.00
Rotation 5	1,376,550.00	947,650.00	428,900.00

Chiffre d'affaires annuel	6,882,750.00	Marge Brute annuelle % de la marge brute sur le C.A.	2,144,500.00 31.16%
---------------------------	---------------------	--	--

² Ces calculs ne tiennent pas compte du coût de l'installation initiale; ce coût diffère en fonction des matériaux utilisés.

